

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### ÁCIDO VANIL MANDELÍCO/ CATECOLAMINAS/ METANEFRRINAS

- 1- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032. O frasco contém ácido cuja função é de conservar a urina, não devendo, portanto ser desprezado.
- 2- Durante as 24horas antes de iniciar a coleta e durante o exame não fazer uso de: Refrigerantes em geral, principalmente coca-cola, Chá, Café e Fumo;
- 3- Permanecer 7 dias sem ingerir medicamentos que podem interferir no exame: alfa-bloqueadores, antidepressivos, antihistamínicos, antipsicóticos, beta-bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, drogas catecolamina-like, diuréticos, inibidores da monoaminoxidase, estimulantes, simpaticomiméticos, vasodilatadores, anti-hipertensivos, agonista dopaminérgico e outros (cocaína, insulina, levodopa, metilfenidato, metoclopramida, morfina, naloxona, fentazocina, proclorperazina e TRH). A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico;
- 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
- 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
- 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.
- 7- Crianças até 10 anos, informar peso e altura. Adultos informar peso.
- 8- Informar horário inicial e final da coleta.

FO-038/03

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### ÁCIDO VANIL MANDELÍCO/ CATECOLAMINAS/ METANEFRRINAS

- 1- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032. O frasco contém ácido cuja função é de conservar a urina, não devendo, portanto ser desprezado.
- 2- Durante as 24horas antes de iniciar a coleta e durante o exame não fazer uso de: Refrigerantes em geral, principalmente coca-cola, Chá, Café e Fumo;
- 3- Permanecer 7 dias sem ingerir medicamentos que podem interferir no exame: alfa-bloqueadores, antidepressivos, antihistamínicos, antipsicóticos, beta-bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, drogas catecolamina-like, diuréticos, inibidores da monoaminoxidase, estimulantes, simpaticomiméticos, vasodilatadores, anti-hipertensivos, agonista dopaminérgico e outros (cocaína, insulina, levodopa, metilfenidato, metoclopramida, morfina, naloxona, fentazocina, proclorperazina e TRH). A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico;
- 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
- 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
- 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.
- 7- Crianças até 10 anos, informar peso e altura. Adultos informar peso.
- 8- Informar horário inicial e final da coleta.

FO-038/03