

INSTRUÇÕES DE COLETA

Cultura, Bacterioscopia e Antibiograma de urina 1º jato (Cultura, Bacterioscopia e Antibiograma de Secreção Uretral)

- 1- Informar o uso de antibióticos nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).
- 2- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
- 3- Colher a primeira urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- 4- Fazer a higienização da região genital, que deverá ser lavada com água e sabonete de cima para baixo, a fim de evitar contaminação com secreção vaginal e/ou fecal.
- 5- Enxaguar.
- 6- Enxugar com gaze estéril, pressionar levemente a região genital.
- 7- Recomendar-se colher o primeiro jato (até 30 ml). Este método também pode ser realizado como substituto de cultura de secreção uretral nos indivíduos que apresentam quantidade insuficiente de secreção para a realização de exame.

Observações Importantes:

- a) Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.

FO-332

INSTRUÇÕES DE COLETA

Cultura, Bacterioscopia e Antibiograma de urina 1º jato (Cultura, Bacterioscopia e Antibiograma de Secreção Uretral)

- 1- Informar o uso de antibióticos nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).
- 2- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
- 3- Colher a primeira urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- 4- Fazer a higienização da região genital, que deverá ser lavada com água e sabonete de cima para baixo, a fim de evitar contaminação com secreção vaginal e/ou fecal.
- 5- Enxaguar.
- 6- Enxugar com gaze estéril, pressionar levemente a região genital.
- 7- Recomendar-se colher o primeiro jato (até 30 ml). Este método também pode ser realizado como substituto de cultura de secreção uretral nos indivíduos que apresentam quantidade insuficiente de secreção para a realização de exame.

Observações Importantes:

- a) Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.

FO-332