

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### GLICEMIA PÓS-PRANDIAL

- 1- A coleta da glicemia pós-prandial deve ser realizada 1 ou 2 horas após o início da refeição (dependendo da solicitação médica), que deve ser completada em um prazo de 15 a 20 minutos, portanto, o tempo deve ser marcado a partir do **início** da refeição;
- 2- No intervalo entre o término da refeição e a coleta do exame **não** é permitido ingerir nenhum tipo de alimento, exceto água.
- 3- O cliente deve chegar ao laboratório para a coleta no prazo de 10 a 15 minutos **antes** de completar as 2 horas, para que possam ser realizados os procedimentos administrativos pertinentes à mesma;
- 4- Para a correta interpretação do resultado deste exame, é fundamental seguir as orientações descritas nesta instrução de coleta.
- 5- O uso de medicamentos para diabetes não deve ser suspenso, a não ser que exista informação contrária do médico assistente.

Horário de almoço

Horário da coleta

Até as \_\_ : \_\_ h.

Até as \_\_ : \_\_ h.

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### GLICEMIA PÓS-PRANDIAL

1. A coleta da glicemia pós-prandial deve ser realizada 1 ou 2 horas após o início da refeição (dependendo da solicitação médica), que deve ser completada em um prazo de 15 a 20 minutos, portanto, o tempo deve ser marcado a partir do **início** da refeição;
2. No intervalo entre o término da refeição e a coleta do exame **não** é permitido ingerir nenhum tipo de alimento, exceto água.
3. O cliente deve chegar ao laboratório para a coleta no prazo de 10 a 15 minutos **antes** de completar as 2 horas, para que possam ser realizados os procedimentos administrativos pertinentes à mesma;
4. Para a correta interpretação do resultado deste exame, é fundamental seguir as orientações descritas nesta instrução de coleta.
5. O uso de medicamentos para diabetes não deve ser suspenso, a não ser que exista informação contrária do médico assistente.

Horário de almoço

Horário da coleta

Até as \_\_ : \_\_ h.

Até as \_\_ : \_\_ h.