

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### Sangue Oculto nas Fezes

- 1- Não há necessidade de dieta específica para realização do teste, mas é recomendada uma alimentação rica em fibras para facilitar a evacuação.
- 2- Pacientes constipados podem utilizar o laxante Tamarine ou supositório de glicemia.
- 3- Três dias antes da coleta e no dia do exame, o cliente deve seguir rigorosamente as seguintes instruções:
  - Não ingerir quantidade excessiva de bebidas alcoólicas;
  - Não utilizar medicamentos que irritem a mucosa gástrica, tais como Aspirina, antiinflamatórios não esteróides e corticosteróides. Entretanto, a suspensão de qualquer medicamento deve ter o consentimento do médico assistente.
- 4- Com o auxílio de uma espátula transferir para o frasco o equivalente a uma colher de sopa cheia.
- 5- A amostra não deve ser contaminada com urina.
- 6- O material não pode ser colhido do vaso sanitário.
- 7- Para as crianças que usam fralda ou que estão com diarreia, a amostra pode ser obtida por meio de saquinho do tipo “coletor de urina” e entregue nesse mesmo invólucro.
- 8- A amostra não pode ser colhida durante o período menstrual ou quando houver sangramento de hemorróidas. Neste caso, o cliente deve aguardar no mínimo 48 horas após o sangramento ter cessado.
- 9- Em caso de uso de contraste radiológico por via oral, é necessário aguardar 72 horas para a coleta.
- 10- O material precisa ser entregue até 12 horas após a coleta se for mantido refrigerado.
- 11- A amostra não pode ser congelada.
- 12- Caso sejam solicitados três amostras de sangue oculto, a coleta deve ser feita em três dias diferentes ou à critério do médico assistente.

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### Sangue Oculto nas Fezes

- 1- Não há necessidade de dieta específica para realização do teste, mas é recomendada uma alimentação rica em fibras para facilitar a evacuação.
- 2- Pacientes constipados podem utilizar o laxante Tamarine ou supositório de glicemia.
- 3- Três dias antes da coleta e no dia do exame, o cliente deve seguir rigorosamente as seguintes instruções:
  - Não ingerir quantidade excessiva de bebidas alcoólicas;
  - Não utilizar medicamentos que irritem a mucosa gástrica, tais como Aspirina, antiinflamatórios não esteróides e corticosteróides. Entretanto, a suspensão de qualquer medicamento deve ter o consentimento do médico assistente.
- 4- Com o auxílio de uma espátula transferir para o frasco o equivalente a uma colher de sopa cheia.
- 5- A amostra não deve ser contaminada com urina.
- 6- O material não pode ser colhido do vaso sanitário.
- 7- Para as crianças que usam fralda ou que estão com diarreia, a amostra pode ser obtida por meio de saquinho do tipo “coletor de urina” e entregue nesse mesmo invólucro.
- 8- A amostra não pode ser colhida durante o período menstrual ou quando houver sangramento de hemorróidas. Neste caso, o cliente deve aguardar no mínimo 48 horas após o sangramento ter cessado.
- 9- Em caso de uso de contraste radiológico por via oral, é necessário aguardar 72 horas para a coleta.
- 10- O material precisa ser entregue até 12 horas após a coleta se for mantido refrigerado.
- 11- A amostra não pode ser congelada.
- 12- Caso sejam solicitados três amostras de sangue oculto, a coleta deve ser feita em três dias diferentes ou à critério do médico assistente.