

INSTRUÇÕES DE COLETA

TEMPO DE PROTOMBINA (TAP)

1. Jejum não é necessário após dieta leve, jejum de 3 horas após as principais refeições.
2. Informar todos os medicamentos tomados nos últimos 7 dias, especialmente anticoagulantes (Coumadin, Dindevan, Eumidine, Marcoumar, Marevam, Neo-Sintron, Pindione, Previscan, Sintron, Tromexam) ®, heparina, antibióticos, anti-inflamatórios e ácido acetil-salicílico (Aspirina®, AAS®, Melhoral®, Bufferin®, etc.).
3. Usuários de anticoagulante oral devem procurar tomar o medicamento sempre no mesmo horário das coletas anteriores.

FO-347

INSTRUÇÕES DE COLETA

TEMPO DE PROTOMBINA (TAP)

1. Jejum não é necessário após dieta leve, jejum de 3 horas após as principais refeições.
2. Informar todos os medicamentos tomados nos últimos 7 dias, especialmente anticoagulantes (Coumadin, Dindevan, Eumidine, Marcoumar, Marevam, Neo-Sintron, Pindione, Previscan, Sintron, Tromexam) ®, heparina, antibióticos, anti-inflamatórios e ácido acetil-salicílico (Aspirina®, AAS®, Melhoral®, Bufferin®, etc.).
3. Usuários de anticoagulante oral devem procurar tomar o medicamento sempre no mesmo horário das coletas anteriores.

FO-347