



## INSTRUÇÕES DE COLETA

### **Urocultura ou Cultura de Urina de Jato Médio (Bacterioscopia de urina e Antibiógrama)**

- 1- Informar o uso de antibiótico nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).
- 2- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
- 3- Colher a primeira urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- 4- Fazer a higienização da região genital, que deverá ser lavada com água e sabonete de cima para baixo, a fim de evitar contaminação com secreção vaginal e/ou fecal.
- 5- Enxaguar.
- 6- Enxugar com gaze estéril, pressionar levemente a região genital.
- 7- Desprezar o 1º jato de urina no vaso sanitário e em seguida colher o jato médio em frasco estéril fornecido pelo laboratório e desprezar o jato final.

#### Observações importantes:

- a) Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.
  - b) Crianças que usam fraldas:
    - A amostra tem que ser colhida no laboratório devido à necessidade de antissepsia e colocação apropriada do saco coletor.
    - Se não houver urgência, a criança deverá tomar banho em casa, antes de chegar à unidade, para a coleta de urina.
    - Nos meninos, recomendar-se realizar a higiene do prepúcio com sabonete líquido.
- O Laboratório não realiza a passagem de sonda vesical.

FO-033/01



## INSTRUÇÕES DE COLETA

### **Urocultura ou Cultura de Urina de Jato Médio (Bacterioscopia de urina e Antibiógrama)**

- 1- Informar o uso de antibiótico nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).
- 2- As amostras devem ser colhidas preferencialmente no laboratório.
- 3- Colher a primeira urina da manhã, ou pelo menos, estar 2 horas sem urinar.
- 4- Fazer a higienização da região genital, que deverá ser lavada com água e sabonete de cima para baixo, a fim de evitar contaminação com secreção vaginal e/ou fecal.
- 5- Enxaguar.
- 6- Enxugar com gaze estéril, pressionar levemente a região genital.
- 7- Desprezar o 1º jato de urina no vaso sanitário e em seguida colher o jato médio em frasco estéril fornecido pelo laboratório e desprezar o jato final.

#### Observações importantes:

- a) Mulheres durante o período menstrual, colocar tampão vaginal antes de colher a urina.
  - b) Crianças que usam fraldas:
    - A amostra tem que ser colhida no laboratório devido à necessidade de antissepsia e colocação apropriada do saco coletor.
    - Se não houver urgência, a criança deverá tomar banho em casa, antes de chegar à unidade, para a coleta de urina.
    - Nos meninos, recomendar-se realizar a higiene do prepúcio com sabonete líquido.
- O Laboratório não realiza a passagem de sonda vesical.

FO-033/01